

NEWSFLASH

ÉDITION
JAN—22

VOTRE HEALTHCARE &
BEAUTY CHANNEL



EXCOMmedia
Healthcare & Beauty Channel



**VAINQUEUR DU CONCOURS
DÉCEMBRE**

DOMINIQUE BENGUEREL

Dropa Drogerie Arnold
2540 Grenchen

Nous adressons nos sincères félicitations!

**NOTRE PRIX DE
CONCOURS EN
JANVIER**

**Bon zalando d'une valeur
de CHF 250.-**



zalando

CHF 250.-

VOTRE LOGIN

[www.hcbc.excommedia.ch
/login-professionnels](http://www.hcbc.excommedia.ch/login-professionnels)

Login
personnel spécialisé

Nom d'utilisateur
excommedia

Mot de passe
channel

AU CONCOURS



NOS SPOTS PRODUITS EN JANVIER



▶ 03. - 30. JANVIER

Bisolvon®: L'expert de la toux

Une solution pour chaque toux

Toux grasse

Bisolvon sirop: Triple action contre la toux grasse

Toux sèche et toux grasse

Bisolvon Phyto Complete: Solution complète contre la toux de refroidissement (Dispositif médical)

Toux sèche

Bisolvon Dual: Solution apaisante unique 2 en 1 (Dispositif médical)



Médicament catégorie de remise Swissmedic D

sanofi aventis (suisse)

Suurstoffi 2

6343 Rotkreuz



▶ 01. - 18. JANVIER

Supradyn® pro energy-complex

FORTES SOLLICITATIONS -

En cas de fatigue et de système immunitaire sollicité

Supradyn pro energy-complex est adapté aux périodes de fortes sollicitations. Il aide à recharger les batteries et soutient le système immunitaire. Les vitamines B contribuent à réduire la fatigue, les vitamines C et D contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 1 comprimé effervescent par jour.

Bayer (Schweiz) AG

Uetlibergstrasse 132

8045 Zurich

www.bayer.com



▶ 01. - 23. JANVIER

Neocitran® Gripe/ Refroidissement

Combat 6 symptômes de la grippe et du refroidissement:

- Fièvre
- Douleurs des membres
- Frissons
- Maux de tête
- Nez bouché
- Nez qui coule



Médicament catégorie de remise Swissmedic D

GSK Consumer

Healthcare Schweiz AG

Tél. 0800 106 800

swiss.consumer@gsk.com

www.neocitran.ch



▶ 03. - 30. JANVIER

Tout le monde a des hémorroïdes! C'est une bonne chose.

En cas de démangeaisons, de brûlures ou de douleurs.

SULGAN® N élimine instantanément les démangeaisons et les douleurs, inhibe les inflammations et soulage ainsi les troubles engendrés par les hémorroïdes. Plus le traitement est pris tôt, plus la guérison sera rapide.



Médicament catégorie de remise Swissmedic D

Doetsch Grether SA

Sternengasse 17

4051 Bâle

Tél. 061 287 34 11

info@doetschgrether.ch

www.doetschgrether.ch



▶ 10. - 30. JANVIER

Otrivin Rhume Plus

Triple action contre le rhume

1. Dégage le nez en quelques minutes
2. Favorise la cicatrisation
3. Protège la muqueuse nasale grâce au dexpanthénol



Médicament catégorie de remise Swissmedic D

GSK Consumer

Healthcare Schweiz AG

Tél. 0800 106 800

swiss.consumer@gsk.com

www.gsk.com

NOS THÈMES EN JANVIER



GRIPPE
VITAMINES
ARRÊTER DE
FUMER
PUBLICITÉ DE
MARQUE AVEC
MEPHA PHARMA



Oubliez la déprime et souriez à la vie.

remotiv® - Lors de baisse de l'humeur

Seul extrait de millepertuis en Suisse sans interactions pharmacocinétiques liées aux CYP 10* grâce à sa faible teneur en hyperforine.¹

* Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement pertinente avec CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19 et p-gp.^{1,2}

Max Zeller Söhne SA
Seeblickstrasse 4
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

▶ 10. - 30. JANVIER



Médicament catégorie de remise Swissmedic D



Pretufen® Rhume & douleurs liées à un refroidissement

En cas de rhume accompagné de douleurs et/ou de fièvre dues à un refroidissement.

Comprimés pelliculés avec 200 mg d'ibuprofène et 30 mg de pseudoéphédrine par comprimé.

Bayer (Schweiz) AG
Uetlibergstrasse 132
8045 Zurich
www.bayer.com

▶ 03. - 31. JANVIER



Médicament catégorie de remise Swissmedic D



Blistex®

Votre spécialiste du soin des lèvres

Depuis plus de 70 ans, nous utilisons nos connaissances et notre savoir-faire exceptionnels dans ce domaine pour le développement des produits de grande qualité, à la pointe de la recherche scientifique que, qui agissent rapidement pour protéger et soulager les lèvres.

Doetsch Grether SA
Sternengasse 17
4051 Bâle
Tél. 061 287 34 11
info@doetschgrether.ch
www.doetschgrether.ch

▶ 01. - 12. JANVIER

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION AUX PROFESSIONNELLS

Bisolvon

Bisolvon®, comprimés ; Bisolvon® sirop contre la toux contre la toux, sirop PA: Bromhexini hydrochloridum. I : Formation excessive de mucus lors de toux due à un refroidissement. Sur prescription médicale, également lors d'affections chroniques des voies respiratoires avec formation de sécrétions persistantes et ralentissement du transport des sécrétions. P: comprimés: adultes et enfants > 10 ans 3 x jour. Sirop: adultes et enfants > 10 ans: 5-10 ml 3 x jour. Enfants 5-10 ans: 2,5-5 ml 3 x jour. Petits enfants > 2 ans: 1,25 ml 3 x jour. CI: hypersensibilité au principe actif bromhexine ou à un autre composant selon composition. Bisolvon est contre-indiqué en cas d'intolérance héréditaire rare et grave par rapport à un excipient du médicament. MP: prudence chez les patients présentant ou ayant présenté des ulcères gastriques. L'administration simultanée de codéine ou d'un autre antitussif peut provoquer chez les patients très encombrés une accumulation des sécrétions, risquant de causer un bronchospasme. En cas de suspicion d'une maladie respiratoire grave, consulter un médecin. Diminuer la dose d'entretien ou prolonger l'intervalle entre les doses en cas de fonction rénale réduite ou de troubles graves de la fonction hépatique. Interrompre immédiatement le traitement en cas d'apparition de réactions d'hypersensibilité et, le cas échéant, consulter un médecin. Très rares cas de lésions cutanées graves telles que le SJS, la NET et le syndrome de Lyell en association temporelle. Si des lésions cutanées ou des muqueuses se produisent à nouveau, un médecin doit être consulté immédiatement et le traitement interrompu. Ne pas administrer en cas de rare intolérance héréditaire au galactose. Ne pas administrer en cas de rare intolérance héréditaire au fructose. Ce médicament peut avoir un léger effet laxatif. L'administration concomitante d'AINS peut entraîner une augmentation réciproque de l'effet irritant sur la muqueuse stomacale. Bisolvon sirop contre la toux contient en plus 6,35 mg d'acide benzoïque pour 5 ml, correspondant à 1,27 mg/1 ml. EI: douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhées. Pr : comprimés (sécables): 50 pcs. Sirop contre la toux: 200 ml. Cat.rem.: D. Tit. AMM: sanofi-aventis (suisse) sa, 1214, 1214 Vernier/GE. Mäj : mai 2021

NeoCitran

C: 1 sachet contient 10 mg Phenylephrini hydrochloridum, 20 mg Pheniraminum hydrogenomaleas, 50 mg Acidum ascorbicum, 500 mg Paracetamolum; Saccharum, Aromatica, Color.: E 104, E 127, E 171. I: Traitement à court terme des symptômes de la grippe et des refroidissements chez l'adulte. PO: Adultes & adolescents plus de 14 ans: délayer un sachet dans de l'eau chaude (environ 2,5 dl) et boire aussi chaud que possible. Si nécessaire, répéter après 4 heures. Délai minimal entre 2 prises: 4 heures. Dose maximale: 3 sachets/jour. La dose quotidienne maximale ne doit pas être dépassée. CI: Hypersensibilité à tout ou partie des principes actifs ou à un des excipients, troubles graves de la fonction hépatique ou rénale, hyperbilirubinémie héréditaire, maladie cardiaques et circulatoires graves, hypertension, phéochromocytome, hyperurémie, hyperplasie bénigne de la prostate, anémie hémolytique, glaucome à angle fermé, consommation excessive d'alcool, traitement simultané par inhibiteurs de la MAO, par antidépresseurs tricycliques, par bêtabloquants, par d'autres sympathicomimétiques, patients épileptiques, grossesse et allaitement, enfants de moins de 14 ans. PR: Ne pas prendre régulièrement de manière prolongée. 1 sachet contient environ 20 g de sucre ; prudence en cas de diabète. Peut entraîner une fatigue et réduire les capacités de réaction. Attention lors de la conduite de véhicules ou de l'utilisation de machines. EI: Somnolence, nausées et vomissements. IA: Voir l'information destinée aux professionnels. P: Emballages de 12 sachets. Liste D. PM-CH-NEOC-21-00061 Pour des informations détaillées, veuillez consulter l'information sur le médicament sur www.swissmedinfo.ch. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, Risch.

Sulgan®N

SULGAN-N onguent. Composition: chlorhydrate anhydre de lidocaïne, camphre racémique, lévomenthol. SULGAN-N suppositoires. Composition: lidocaïne, camphre racémique, lévomenthol. SULGAN-N lingettes médicinales. Composition: chlorhydrate de lidocaïne, camphre racémique, lévomenthol. Indications: pour le traitement local des hémorroïdes internes et externes. Posologie. Onguent: appliquer un ruban de 1 à 2 cm d'onguent 2 à 3 fois par jour sur les zones atteintes. Suppositoires: introduire dans l'anus 1 suppositoire le soir, une fois couché. Lingettes médicinales: nettoyer soigneusement et à fond la région anale en cas de besoin. Contre-indications: SULGAN-N onguent, suppositoires et serviettes médicinales ne doivent pas être utilisés lors d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients conformément à la composition en cas d'hémorroïdes sanguinolentes ainsi que lors de l'apparition de saignements dans la région anale. SULGAN-N n'est pas adapté à une utilisation chez l'enfant. Mises en garde et précautions: si les troubles ne disparaissent pas, ne régressent pas nettement ou se sont même aggravés après 1 à 2 semaines de traitement, des examens médicaux à visée diagnostique sont indiqués. Des utilisations répétées n'auront lieu que dans le cas d'un diagnostic médical sûr et ne dureront pas plus de 2 semaines. Consulter un médecin pour des examens complémentaires lors de pertes sanguinolentes ou de suspicion de sang dans les selles, ainsi que lors de l'apparition simultanée de douleurs dans la région anale et de fièvre. Effets indésirables: peau et tissus sous-cutanés: une sensation de brûlure apparaissant occasionnellement lors de l'utilisation de Sulgan-N serviettes médicinales est due à l'effet des principes actifs sur une lésion cutanée préexistante et peut être considérée comme une réaction normale. Cette manifestation secondaire disparaîtra lors de la poursuite du traitement. Des réactions d'hypersensibilité locales peuvent apparaître dans de rares cas. Si cela devait se produire, interrompre le traitement immédiatement et consulter un médecin. Présentation: onguent 30 et 50 g, suppositoires 10 et 20 unités, serviettes médicinales en sachets de 10 et en dispensateur 25 unités. Liste D. Doetsch Grether SA, 4051 Bâle. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedinfo.ch

Otrivin Rhume Plus

C: 1 pulvérisation à 0,1 ml solution contient: 0,1 mg de chlorhydrate de xylométazoline; 5,0 mg de dexpanthénol; conserv.: chlorure de benzalkonium, excip ad solut. I: Rhume. Pour décongestionner la muqueuse nasale en cas de rhume tout en protégeant l'épithélium. PO: Adultes et adolescents dès 12 ans: 1 pulvérisation dans chaque narine, au maximum 3 fois par jour. CI: Hypersensibilité, rhinite sèche, rhinite atrophique, glaucome à angle aigu, après une hypophysectomie transphénoïdale, enfants de moins de 12 ans. PR: Prudence en cas d'hypertension, de maladies cardio-vasculaires, d'hyperthyroïdie, de diabète, de phéochromocytome, d'hyperplasie de la prostate, avec les inhibiteurs de la MAO. IA: IMAO, antidépresseurs tri- et tétracycliques, médicaments à effet hypertenseur. G: Ne doit pas être utilisé. EI: Sensation de brûlure au site d'administration, sécheresse nasale, rhinite médicamenteuse, hyperémie réactive, augmentation de la pression artérielle. P: Spray-doseur 10ml, liste D. Pour des informations détaillées, veuillez consulter l'information sur le médicament sur www.swissmedinfo.ch. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, Risch.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION AUX PROFESSIONNELS

Remotiv
remotiv[®] 500 mg: C: extrait sec de millepertuis Ze 117, 500 mg, max. 1 mg hyperforine/dose journalière I: en cas de baisse et de labilité de l'humeur, de nervosité, d'anxiété, d'états de tension, ainsi que lors de troubles d'endormissement et du sommeil liés à ces états P: remotiv[®] 500: à partir de 12 ans: 1x 1 comprimé pelliculé par jour; enfants de plus de 6 ans: uniquement sur indication expresse du médecin CI: hypersensibilité au millepertuis ou aux composants employés, hypersensibilité connue à la lumière, enfants < 6 ans IA: antidépresseurs et autres substances sérotoninergiques EI: céphalées, transpiration, asthénie, vertiges, fatigue, agitation, troubles gastro-intestinaux réactions allergiques ou phototoxiques de la peau CR: D TI: Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn Informations détaillées relatives au médicament: www.swissmedicinfo.ch (mise à jour des informations: septembre 2019).


¹ Fachinformation remotiv[®] 500, www.swissmedicinfo.ch (Stand der Information: September 2019). ² Zahner C. et al., No Clinically Relevant Interactions of St. John's Wort Extract Ze 117 Low in Hyperforin With Cytochrome P450 Enzymes and P-glycoprotein. Clin Pharmacol Ther. 2019;106(2):432-440.

Pretufen[®] Rhume & douleurs liées à un refroidissement

C: Ibuprofenum 200 mg; Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg. I: Traitement symptomatique à court terme de la congestion nasale accompagnée d'une rhinosinusite aiguë avec suspicion d'origine virale et de maux de tête et/ou de fièvre. P/ME: Adultes et adolescents à partir de 15 ans: dose unitaire: 1 à 2 comprimés, dose journalière maximale: jusqu'à 6 comprimés. Avaler les comprimés sans les croquer avec de l'eau. CI: notamment hypersensibilité à l'un des composants et/ou à un autre AINS, enfants de moins de 15 ans, grossesse/allaitement, diff. gastro-entéropathies, saignements, insuffisance rénale sévère, diff. maladies cardiaques, diff. médicaments. MG/Préc.: notamment durée du traitement 3 jours, arrêt du traitement notamment en cas de tachycardie, palpitations, signes neurologiques. Respect de la posologie. Patients âgés, prise concomitante de diurétiques/inhibiteurs de l'ECA, asthme, sportifs, capacité de conduire. IA: notamment inhibiteurs de la MAO, sympathomimétiques, AINS, anticoagulants oraux, héparine, lithium, ISRS, méthotrexate, permetrexed, alcool. EI: notamment troubles gastro-intestinaux, maladies du système nerveux, troubles psychiatriques, maladies respiratoires, thoraciques et médiastinales. Liste D. Pour des informations détaillées : www.swissmedicinfo.ch

Exemplaire

CONCOURS DU MOIS POUR LE PERSONNEL SPÉCIALISÉ




<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Spot 1



<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Spot 2




<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Spot 3



<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Spot 4



<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Spot 5

PRIX DE CONCOURS EN JANVIER:



Bon zaland
d'une valeur
de CHF 250.-

Concours Newsflash pour le personnel spécialisé!

Faites passer cette pré-information mensuelle à toute votre équipe et l'un de ses membres comptera peut-être bientôt parmi les heureux gagnants du concours attractif. Trouvez les différences dans les illustrations de spot et inscrivez les réponses dans les champs correspondants.

Participez au concours via notre site internet
www.hcbc.excommedia.ch/login-professionnels

Nom d'utilisateur: excommedia

Mot de passe: channel

Date limite d'envoi : le 25 de chaque mois.

Vous avez la possibilité de participer à notre concours par fax. Il vous suffit d'indiquer la bonne réponse, votre nom, votre pharmacie et votre adresse électronique dans les champs prévus à cet effet et de nous faxer le bulletin de participation au **044 782 22 09**. Le tirage au sort aura lieu à la fin de chaque mois. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera publié dans le prochain Newsflash que vous recevrez automatiquement par courriel ou par poste.

Nous vous souhaitons bonne chance!

FAX RÉPONSE

044 782 22 09

SOLUTION:

SPOT 1

SPOT 2

SPOT 3

SPOT 4

SPOT 5

Prénom / Nom

Pharmacie

NPA / lieu

Votre e-mail

Remarques

Conditions de participation: chaque bonne réponse participera au tirage au sort. Le recours juridique est exclu. Les prix ne seront pas versés sous forme d'espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Les participants déclarent accepter les présentes conditions de participation.